

Guide d'identification des papillons de jour de Suisse

1330 illustrations - 2050 critères d'identification



Vincent Baudraz & Michel Baudraz

2^e édition

42 1 bleu / 30 pas de taches orange / 38 tache(s) orange / 39 petite queue / 40 marbrures blanches



Sous l'aile arrière, le point noir désigné est **bordé de bleu métallique du côté externe et d'orange du côté interne**

➤ **Azuré porte-queue**
Lampides boeticus

N° planche
20.5



Sous l'aile arrière, le point noir désigné est **cerclé de bleu métallique puis au moins en partie d'orange**

➤ **Azuré de la luzerne**
Leptotes pirithous

N° planche
20.6



43 1 bleu / 30 pas de taches orange / 38 tache(s) orange / 39 pas de petite queue



Sous l'aile avant, **un ou plusieurs point(s) noir(s)** à la base de l'aile


➤ **44**



Sous l'aile avant, **pas de points noirs** à la base de l'aile

➤ **48**


44 1 bleu / 30 pas de taches orange / 38 tache(s) orange / 39 pas de petite queue / 43 point(s) noir(s) à la base



Sur et sous l'aile avant, **taches foncées** dans la frange

➤ **45**

Attention: chez les vieux individus, les franges peuvent être usées ou avoir disparu; les taches noires peuvent alors ne plus être visibles




Sur et sous l'aile avant, **pas de taches foncées** dans la frange

➤ **47**


Lycénidés : cuivrés

12.1 - Cuivré de la bistorte - *Lycaena helle*

mâle: foncé avec reflets violacés (parfois légers)



femelle: taches violettes




bordure orange

bande orange vif

rangée de taches blanches assez régulières, souvent en forme de "V" (cf. *L. virgaureae* 12.4)


12.2 - Cuivré commun - *Lycaena phlaeas*

large bordure brun-noir



souvent de minuscules taches bleues

brun bande orange



points noirs petits et estompés, parfois absents



ligne orange-rouge fine et accidentée

12.3 - Cuivré des marais - *Lycaena dispar*

mâle: marque noire (cf. *L. virgaureae* 12.4 et *L. hippothoe eurydame* 13.2b)

mâle: bordure noire s'élargissant légèrement en direction de la pointe (cf. *L. virgaureae* 12.4 et *L. hippothoe eurydame* 13.2b)




mâle: presque entièrement orange vif

mâle: marque noire fine ou très fine (cf. *L. virgaureae* 12.4 et *L. hippothoe eurydame* 13.2b)

mâle: ces deux points noirs très souvent fusionnés, rarement juste en contact (cf. *L. virgaureae* 12.4)

mâle: coin de l'aile orange (cf. *L. hippothoe eurydame* 13.2b)

points noirs souvent à moitié noyés dans la fine bordure noire, sinon au moins juste en contact, p.ex. (cf. *L. virgaureae* 12.4 et *L. hippothoe eurydame* 13.2b)



femelle: large bordure brun-noir

femelle: 3 ou 4 nervures orange

femelle: bande orange

orange vif bordure grise

taches noires de la bordure allongées (cf. *L. hippothoe euridice* 13.2a)

arc de points noirs restant parallèle au bord de l'aile (cf. *L. hippothoe euridice* 13.2a)

base légèrement bleutée

marque noire fine ou très fine, souvent discontinue (p.ex. ; ou ;)

gris clair

bande orange vif

12.4 - Cuivré de la verge d'or - *Lycaena virgaureae*

mâle: rarement une marque noire (cf. *L. dispar* 12.3 et *L. hippothoe eurydame* 13.2b)

mâle: bordure noire s'élargissant fortement en direction de la pointe (cf. *L. dispar* 12.3 et *L. hippothoe eurydame* 13.2b)



mâle: presque entièrement orange vif

mâle: pas de marque noire (cf. *L. dispar* 12.3)

mâle: ces deux points noirs très souvent séparés l'un de l'autre, rarement juste en contact (cf. *L. dispar* 12.3)

mâle: coin de l'aile orange (cf. *L. hippothoe eurydame* 13.2b)

points noirs juste en contact avec la fine bordure noire, p.ex. (cf. *L. dispar* 12.3 et *L. hippothoe eurydame* 13.2b)

femelle: rangée de taches brun-noir grandes et diffuses, parfois en partie fusionnées



femelle: bordure brun-noir fine

femelle: souvent quelques petites taches blanches



orange ocre

taches blanches très irrégulières (cf. *L. helle* 12.1)

12.5 - Cuivré flamboyant - *Lycaena alciphron*

mâle: très légèrement violacé

points noirs par paires "en escalier"

mâle: bordure noire fine

poils bleutés sur le corps (surtout chez le mâle)




femelle: bordure noire large à la pointe et fine en bas

points noirs par paires "en escalier"


grands points noirs

bande orange vif

gris clair très légèrement rose (cf. *L. hippothoe euridice* 13.2a)




33.2




Borethis ino
Nacré de la sanguisorbe

33.3




Boloria napaea
Nacré des renouées

33.4




Boloria pales
Nacré subalpin

33.5




Boloria aquilonaris
Nacré de la canneberge

34.1




Boloria titania
Nacré porphyrin

34.2




Boloria dia
Petite Violette

34.3




Boloria thore
Nacré noirâtre

34.4



Boloria selene
Petit Collier argenté

34.5



Boloria euphrosyne
Grand Collier argenté